

1939

Aus der Chirurgischen Klinik
der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg
Direktor: i. V. Prof. Dr. Wagner

**Spätergebnisse
der ischiorektalen Operation
bei Atresia ani vaginalis**

INAUGURAL-DISSERTATION

zur
Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin
der Hohen Medizinischen Fakultät
der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg

Vorgelegt von

ERNST SCHROEDER

aus Glogau

LANE MEDICAL LIBRARY
SAN FRANCISCO

Halle (Saale) 1939

Aus der Chirurgischen Klinik
der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg
Direktor: i. V. Prof. Dr. Wagner

Spätergebnisse der ischiorektalen Operation bei Atresia ani vaginalis

INAUGURAL-DISSERTATION

zur

Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin
der Hohen Medizinischen Fakultät
der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg

Vorgelegt von

ERNST SCHROEDER

aus Glogau

Halle (Saale) 1939

Eduard Klinz Buchdruck-Werkstätte Halle (Saale), Dölauer Str. 14

1. Berichterstatter: Doz. Dr. Klages.


2. Berichterstatter: Prof. Dr. Wagner.

Tag der mündlichen Prüfung: 14. Juli 1939.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät.



Digitized by the Internet Archive
in 2026



Unter den congenitalen Mißbildungen des Darmes spielt die Analatresie, d. h. der vollständige Verschuß der normalen Afteröffnung, sei es in der reinen Form als Atresia ani simplex, sei es kompliziert durch eine fehlerhafte Verbindung des blind endenden Darmes mit einem anderen Organ, eine besondere Rolle.

Nicht nur die reinen Analatresien bedürfen einer sofortigen Hilfe durch operativen Eingriff, um die das Leben des Neugeborenen bedrohenden Ileuserscheinungen nicht erst aufkommen zu lassen, auch die Mehrzahl der Analatresien mit Kommunikationen zu anderen Organen zwingt dem Chirurgen das Messer sofort in die Hand, da der Abfluß des Darminhaltes durch die bestehende Fistel meist ungenügend ist.

Die entwicklungsgeschichtlichen Vorgänge bei dem Zustandekommen der Analatresien mit Kommunikationen zu anderen Organen sind für den Chirurgen immer von besonderem Interesse gewesen; so konnte Stieda zum Verständnis der Genese einen wertvollen Beitrag liefern.

Eine Sonderstellung unter den genannten Mißbildungen des Enddarmes nimmt die Atresie ani vaginalis ein.

Entwicklungsgeschichtlich eine noch umstrittene und schwer erklärbare Mißbildung, bietet die A. a. vag. (Atresia ani vaginalis) dem Operateur vielfältige Schwierigkeiten, andererseits aber auch die besten Erfolgsmöglichkeiten in der Behandlung. Über die Spätergebnisse der operierten Fälle von A. a. vag. ist nur wenig bekannt. Die großenteils von vornherein nicht recht befriedigenden Operationsergebnisse mögen zur weiteren Verfolgung des Schicksals der Operierten wenig anzuregen haben, auch die Möglichkeit, die Operierten späterhin zu erlassen, vielfach verhindert haben.

Zur Frage der Genese der Analatresien, die hier nur kurz soweit gestreift werden soll, als sie zum Verständnis der operativen Verfahren Erwähnung verdient, wäre folgendes zu sagen.

Früher, d. h. im vorigen Jahrhundert, nahmen eine Anzahl Autoren an, daß für die Entstehung der verschiedenen Formen der Analatresien äußere Umstände eine Rolle spielen. So glaubte Cruveilhier als Ursache abnorme Druckverhältnisse oder fötale Entzündungszustände annehmen zu können. Franck war der Ansicht, daß erst nachträgliche Verwachsungen im Mastdarm, welcher bereits gebildet war, durch Obliteration den Zustand der Atresie herbeiführen. Ahlfeld dachte an Intusception, fötale Peritonitis, Darmverwachsung, Einwirkung eines übermäßigen oder abnorm lange fortwährenden Zuges des Dotterstranges am Darm. Lannelong glaubte die Lues als ätiologisches Moment in den Vordergrund stellen zu müssen. Die meisten Autoren erklären jedoch die Atresien als Endzustände einer Entwicklungshemmung.

Den Zustand, den wir beim Menschen am Enddarm des Neugeborenen als die schwerste Mißbildung bezeichnen und die wir auf eine Entwicklungshemmung zurückführen, die persistierende Kloake, finden wir bei Amphibien, Reptilien und Vögeln als einen zeitlich bestehenden Normalzustand. Nach dem biogenetischen Grundgesetz müßte also die Kloakenbildung beim Menschen nicht nur phylogenetisch, sondern auch in seiner embryologischen Entwicklung normalerweise in einem sehr frühen Stadium überwunden sein. Das ist nun auch tatsächlich der Fall. Beim Menschen findet die Trennung zwischen Mastdarm und Urogenitalsystem sehr frühzeitig statt. Bei einem zweimonatigen Embryo von 12—25 mm Länge ist diese Trennung bereits vollendet. Es wird daher nicht Wunder nehmen, daß Fehlbildungen, die wir auf eine Wachstumshemmung in diesem so frühen Embryonalalter zurückführen, unseren operativen Maßnahmen häufiger den Erfolg versagen, als solchen, die erst in einem späteren Zeitpunkt der embryonalen Entwicklung zur Entstehung kommen.

Die physiologische Entwicklung der Trennung der ursprünglich angelegten Kloake in den After und eine Harn- und Geschlechtsöffnung erfolgt dadurch, daß eine in kaudaler Richtung vorspringende und vorrückende Bogenfalte, die Urorektalfalte, den End- oder Mastdarm von dem ventral gelegenen Kloakenrest trennt. Die beiden Schenkel dieser Falte buchten von rechts und links die seitliche Kloakenwand ein. Die beiden Faltenscheitel nähern sich, und durch weiteres kaudal gerichtetes Einschneiden der Falte entsteht eine frontogestellte Scheidewand, das Septum urorectale. Treten nun infolge vorzeitiger Erschöpfung der Entwicklungsfähigkeiten Wachstumshemmungen auf, so kommt es im schwersten Fall überhaupt nicht zur Bildung der Scheidewand — es bleibt also die Kloake bestehen — oder aber bei fehlender Tendenz der beiden Bogenfalten, von der Seite her nach vorn gleichmäßig zusammen zu wachsen, bilden sich eine oder mehrere Lücken in der Scheidewand, d. h. in der Vorderwand des Enddarms; schließlich kann es auch dazu kommen, daß eine mehr oder weniger große Kommunikation zwischen Enddarm und Urogenitalsystem dadurch offen bleibt, daß die Urorektalfalte nicht weit genug kaudalwärts gewachsen ist. In letztem Falle mündet der Enddarm in die Urethra oder das Vestibulum.

Wahrscheinlich ist aber auch der Entwicklungsmechanismus bei den sog. äußeren Fisteln der Analatresie ein derartiger, daß man nicht von echten Fisteln, d. h. Produkten pathologischer Vorgänge sprechen kann. Es spricht mehr dafür, daß diese äußeren Fisteln gleichfalls Reste von Kloakengängen sind, sie wären also auch den Kommunikationen Stiedas zuzurechnen. Stieda hatte bekanntlich durch eine eigene Beobachtung den Beweis erbringen können, daß die bis dahin als innere Fisteln bezeichneten Verbindungen vom Mastdarm zum Urogenitalsystem keine echten Fisteln sein können. Er hatte deshalb die Umbezeichnung der inneren Fisteln in Kommunikationen vorgeschlagen.

Mit Gruber und Politzer kann man sogar annehmen, daß es bei der klinisch als Atresia ani simplex imponierenden Fehlbildung es sich fast immer doch um eine Vergesellschaftung mit einer anderen Fehlbildung in Form von unvollkommenen Mastdarmfisteln handelt, die nichts anderes als Reste des Kloakenganges sind.

Die Analbildung hängt nach den Studien von Anders mit größter Wahrscheinlichkeit von chemotaktischen Reizen ab, die vom Entoderm des Enddarmes auf das Ektoderm im Analgebiet ausgehen, fand dieser Autor doch in allen Fällen, die er untersuchte (70 Embryonen), ein absolutes Parallelgehen zwischen der Ausbildung des Afters und der Entfernung des Enddarmes vom After, d. h. je weiter kaudal der Enddarmsack des Enddarmes zu finden war, um so vollkommener war die Ausbildung der Analgrube.

Schwierigkeiten in der Erklärung der Genese bilden lediglich die Fälle von Analatresie mit Einmündung des Enddarmes in die Vagina und den Uterus. Wenn auch von Grusdow und Bolk auf Grund histologischer Untersuchungen angenommen wird, daß der kaudale Anteil der Vagina sich aus dem Sinus urogenitalis entwickelt habe, so offenbart diese Erklärung für die Kommunikationen des Darmes mit den benachbarten Teilen der Scheide oder gar dem Uterus sicher Mängel.

Menge und Küster nehmen an, daß es sich bei der Entstehung der A.a.vag. um ein sekundäres Produkt einer entzündlichen Obliteration eines bereits angelegten Afters handelt; beide Autoren können sich bei der Annahme der Entstehung der ganzen A.a.vag. aus den Müllerschen Gängen eine A.a.vag. aus der Entwicklungsgeschichte nicht erklären. Grusdow denkt an einen abnormen Durchbruch des Müllerschen Ganges in die gemeinsame Kloake.

Nach Dienst ist die A.a.vag. durch Hemmungsbildungen nicht erklärbar, denn es gibt — abgesehen vom Stadium der ursprünglichen Kloake — keinen Zeitpunkt, in dem Mastdarm und Müllersche Gänge miteinander kommunizieren. Dienst nimmt Verwachsungen der Rathkeschen Falte mit den Müllerschen Gängen und dem Mesodarm an, und sieht auch eine atypische Aufteilung des die Müllerschen Gänge enthaltenden Kloakenanteils für möglich.

Wenn wir mit Anders annehmen, daß die Afterbildung auf Grund eines Reizes vom Enddarm aus erfolgt, so könnte zur Erklärung der Kommunikation des Enddarms mit der Scheide auch die Annahme Berechtigung haben, daß der Reiz des Entoderms im Rektum lokal gesteuert ist und sich anstatt auf das Ektoderm der Analgrube auf die Vagina auswirkt und diese zu einer Kommunikation mit dem Enddarm veranlaßt; vertritt doch C. H. Schröder die Ansicht, daß die letzte Entstehungsursache dieser Mißbildungen in einer falschen Steuerung im Entwicklungsablauf des kaudalen Entodermabschnittes und bestimmter hiervon entwicklungsmechanisch abhängiger anderer Keimblattanteile zu suchen ist. Hierfür sei ein Genkomplex verantwortlich. Genbedingte Wachstumshemmungen infolge

vorzeitiger Erschöpfung der Entwicklungsfähigkeiten und vermehrtes Wachstum liefen dabei anscheinend parallel. Nach C. H. Schröder besteht die Möglichkeit, daß sowohl Wachstums hemmung als auch vermehrtes Wachstum sogar bis zu Organverdoppelungen, wofür der Autor praktische Beispiele bringt, je durch ein krankhaft verändertes Gen bzw. einen Genkomplex verursacht werden. Hierfür würden auch die in der Mehrzahl unserer später noch näher zu beschreibenden Fälle vorgefundene Vergesellschaftung von A. a. vag. mit Megasigmoid congenitum sprechen. Der Erblichkeitsnachweis ist jedoch sehr erschwert, da alle hochgradig genbedingten Mißbildungen vorwiegend rezessiv vererbt werden.

Immerhin haben wir in der Literatur einige Beweise für die Erblichkeit der Analatresien.

Bollmeyer hat über ein Kind mit Analatresie berichtet, dessen Bruder, Vater und Onkel mit derselben Fehlbildung zur Welt gekommen sind.

Nach Bokai wurden in einer Familie unter 15 Kindern 3 mit Analatresia ani beobachtet.

Hadra sah in verschiedenen Generationen einer Familie 6 Fälle von derartigen Mißbildungen.

König berichtet über einen Knaben, dessen Vater und zwei Brüder an einer Analatresie litten,

Wutzer über eine zehnköpfige Geschwisterschaft, von der drei Kinder solche Mißbildungen aufwiesen.

Die Zahl der Fälle von Analatresien wird im Durchschnitt etwa 1 auf 10 000 Neugeborene betragen; Anders gibt 1 auf 6—15 000, Trélat 1 auf 11 000 an.

Unter den Fällen von Analatresie mit Kommunikationen zu anderen Organen ist beim weiblichen Geschlecht am häufigsten die Verbindung des Rektumblindsackes mit dem Vestibulum, etwas seltener die mit der Vagina.

Die Lebensaussichten bei völliger Analatresie sind absolut ungünstig. Diese Kinder leben gewöhnlich nicht länger als 6 Tage, nur Bougeon und Richard berichten von je einem Fall, bei dem das Leben bis zum 13. Tag erhalten blieb. Von allen Kommunikationen der Analatresie mit anderen Organen ist die vestibuläre die günstigste, ihr folgt die vaginale Kommunikation in prognostischer Hinsicht.

Ricord hat von einer 22 jährigen Frau berichtet, bei der das Rektum in die Vagina einmündete. Es war eine derartig gute Kontinenz vorhanden, daß die Stuhlentleerungen nur periodisch eintraten. In drei jähriger Ehe hatte der Ehemann von dem fehlerhaften Zustand nichts bemerkt.

Egström berichtet von einem 15 jährigen Mädchen, bei dem das Rektum in die Vagina einmündete.

Nach Ammon bestand bei einem 7 jährigen Mädchen ein Perilaps des Rektum in die Vagina.

In der gesamten Weltliteratur waren bis 1932 im ganzen 9 Fälle anannt, in denen Frauen mit A. a. vag. Kinder zur Welt gebracht en. Die Infektionsgefahr bei Geburten ist natürlich erheblich.

Sonst aber sind die Gefahren bei der A. a. vag. nicht so schwer, ern nur die Kommunikation mit der Vagina die nötige Weite hat l sonstige Mißbildungen nicht vorhanden sind. Frauen mit A. a. haben wiederholt ein hohes Lebensalter erreicht.

Wenn nun auch in vielen Fällen von A. a. vag. eine vitale erationsindikation zunächst fehlt, so sind doch die auftretenden rungen durch den unfreiwilligen Stuhlabgang, das ständige Beschmut- der Wäsche und den Fäkalgeruch, oft aber auch durch ernstliche undheitsstörungen infolge ileusartiger Erscheinungen so lästig, daß ; dringende Verlangen nach operativer Beseitigung des Zustandes her oder später von der Kranken oder ihren Angehörigen fast stets äußert wird. Zur operativen Behandlung der A. a. vag. sind mehrere rfahren mit den verschiedensten Modifikationen angegeben worden.

Die erste Operationsmethode war die von v. Esmarch als Proktotomie bezeichnete.

Es wurde einfach mit einem Troicart oder einem Skalpelli ch Einstich bzw. Einschnitt dem Kot ein Ausweg im Afterbereich rschafft. v. Esmarch warnt dringend vor diesem Vorgehen. Es be- ht die Gefahr der Verletzung von Blase und Peritoneum, zumal r Blindsack des Enddarmes nicht immer in der Mitte, sondern häufig iter dorsal oder lateral gelegen ist. Im übrigen führt die Methode üfig zu Stenosen und Infektionen durch den abfließenden Stuhl. Esmarch bezeichnet die Proktotomie als die Methode der messer- neuen Ärzte und beklagt sich über die viel zu häufige Anwendung es Verfahrens. Eine bestehende Vaginalkommunikation wurde bei em Vorgehen gänzlich unberücksichtigt gelassen.

Einen wesentlichen Fortschritt in der operativen Behandlung r A. a. vag. brachte die von Dieffenbach 1828 zuerst beschriebene d von Amussat 1835 erstmalig ausgeführte Proktoplastik.

Bei dieser Methode wird ein Schnitt von der Mitte des Peri- ums bis nahe an die Spitze des Steißbeins genau in der Mittellinie ge- art. Der Sphinkter soll höchstens nach hinten und vorn, wo sich ne sehnigen Ansätze befinden, durchtrennt werden. Dann soll genau der Mittellinie bis zur Erreichung des Blindsackes vorgegangen wer- n. Nach Freipräparieren des Darmes wird dieser an seiner Einmün- gungsstelle in die hintere Wand der Vagina abgetrennt und nach ten in die natürliche Analöffnung gezogen, wo er mit den Rän- rn der Hautwunde durch Naht vereinigt wird. Die Muskelfasern des hinkter externus sowohl als die des Sphinkter internus können nach nsicht Dieffenbachs auf diese Weise erhalten bleiben, was für die nktionsfähigkeit des Afters von größtem Wert ist.

Nach Ansicht Berkenheiers ist die beste und einfachste ethode zur Ausführung der Operation der A. a. vag. die von Riz- li angegebene:

Ein perinealer Längsschnitt wird genau in der Mittellinie von der Steißbeinspitze bis nahe an die hintere Commissur der Vulva geführt. Nun wird von hier aus der Blindsack von dem umgebenden Gewebe isoliert und mit einer Schere von der Vaginawand abgetrennt. Das entstehende Loch in der Scheide wird sofort von der Scheide aus durch Naht geschlossen und das abgetrennte Darmende nach unten und hinten gezogen und in die Hautwunde eingenäht, nachdem durch kleine Einschnitte vorn und hinten in den Rand des Darmlumens eine genügende Dehnbarkeit erreicht ist. Um einen möglichst breiten Darm zu erhalten, muß der Hautschnitt in seinem vorderen Teil sofort für sich geschlossen werden. Ist es gelungen, bei der Ausführung der Operation die Sphinkturen zu schonen, so dürften nach Rizzolis Ansicht möglichst normale Verhältnisse hiermit erreicht sein.

Berkenheier berichtet über drei Fälle von A. a. vag., die an der Münchener Chirurgischen Universitätsklinik nach Rizzoli operiert wurden. Das erste Kind endete 16 Tage nach der Operation an einer Pneumonie, das zweite Kind bereits 6 Tage nach der Operation an einer Sepsis und das dritte Kind starb einige Zeit nach der Operation außerhalb der Klinik. Da das erste Kind zur Zeit der Operation vier Tage, das zweite Kind zwei Wochen und das dritte Kind 6 Monate alt war, ist wohl der Schluß erlaubt, daß so kleine Kinder einen derartigen Eingriff im allgemeinen noch nicht aushalten, während bezüglich des Wertes der Rizzolischen Operation selbst keine Schlüsse gezogen werden können.

Noch heute gilt die Proktoplastik in der von Rizzoli angegebenen oder ähnlichen Form als der Weg der Wahl (Drachter).

Freilich gibt es auch Autoren, wie Desmaret und Ebrard, die den perinealen Weg nur den leichten Fällen mit dünner Verschlußplatte vorbehalten wissen wollen, wo eine einfache Incision zur Eröffnung genügt. In allen Fällen, in denen auch nur der Verdacht auf größere Entfernung des Rektumblindsackes von der Analgegend besteht, sollte nach diesen Autoren ein primärer anus praeternaturalis iliacus angelegt werden. Um das dritte Lebensjahr sollte dann erst der Versuch gemacht werden, normale Verhältnisse herzustellen. Anders äußert sich in ähnlichem Sinne.

V. Hochenegg empfahl zur leichteren Auffindung des hochgelegenen Blindsackes den sakralen Weg, wie er von Kraske zur Rektumresektion angegeben wurde, zwecks Anlegung eines anus sacralis.

Drachter empfiehlt bei hochstehendem Blindsack einen großen Schnitt anzulegen und das Steißbein zu resezieren, nach Durchtrennung des levator ani und der Beckenfascie das Peritoneum zu eröffnen und digital den Blindsack zu mobilisieren, diesen in das Niveau der Haut vorzulagern und nach Eröffnung mit der Haut zu vernähen.

Gelingt es auf perinealem Wege nicht, den Blindsack genügend zu mobilisieren, so befürwortet Drachter, nach dem Vorschlag

adras zu verfahren und eine sofortige Laparatomie zum Zwecke der Mobilisierung und Verlagerung des Enddarmes durch den Beckenboden nach dem Damm vorzunehmen (Perineo-abdominale Operationsmethode).

Bei dem perinealen Vorgehen legen Drachter und Klein-schmidt größten Wert darauf, den Sphinkterring völlig zu schonen. Einschmidt empfiehlt daher auch die Kraskesche Steißbeinresektion. Für die Operation einer Analatresie mit hochsitzender Blasenfistel zieht dieser Autor in Erwägung, daß hierbei das Vorgehen von Voelcker der Prostatektomie zum Ziele führen könnte.

Es ist bestimmt das Verdienst von Klages, die von Voelcker für die Prostatektomie angegebene Operationsmethode erstmalig bei mehreren Fällen von A. a. vag. mit Erfolg durchgeführt zu haben.

Wir wissen, daß die Voelckersche Operationsmethode vor allen anderen Methoden, die für die Operation an der Prostata angegeben worden sind, den großen Vorzug hat, daß das Operationsgebiet sehr übersichtlich gemacht wird.

Nun ist aber für das operative Vorgehen bei der A. a. vag. das erste Erfordernis Übersichtlichkeit und weiterhin die Möglichkeit, den Sphinkter externus zu schonen (Borchard).

Beiden Forderungen wird die von Klages angegebene ischiorektale Operationsmethode in einzigartiger Weise gerecht.

Klages hat über seinen ersten Operationsfall selbst berichtet (Archiv für klinische Chirurgie, Bd. 189).

Es handelte sich um einen Fall von A. a. vag. mit hoher Einrindung des Mastdarmes in die Scheide. Das 5 Monate alte Kind befand sich in einem guten Ernährungs- und Kräftezustand.

Um der geplanten plastischen Operation eine erhöhte Sicherheit zu geben, wurde zunächst ein Anus praeternaturalis iliacus angelegt.

Am 28.8.36 erfolgte die ischiorektale Operation: Schnittführung entsprechend der Voelckerschen ischiorektalen Prostatektomie seitlich durch den Levator ani und die tiefe Beckenfascie. Nach Erreichen des Mastdarmes, der sich an der eingeführten Sonde leicht erkennen und bis zur Einmündung in die Scheide verfolgen läßt, Frei-machen der kleinfingerstarken Verbindungsstelle und Auslösen des Mastdarmes, das von diesem seitlichen Zugange aus leicht gelingt. Unter Überblick über die Scheidenwand, deren Defekt mit Einzel-nähten einschichtig versorgt wird. Das Rektumende wird nun all-seitig freigemacht; da es nicht genügend nachgibt, um ohne Span-nung in die Haut herabgezogen zu werden, wird die Douglas-Peritoneal-cavität eröffnet und das Rektum genügend mobilisiert. Sorgfältiger Ver-schluß des Bauchfells. Mit der Kleinfingerkuppe kann von innen her der Schließmuskel getastet werden; Einschneiden der Haut über der Fingerkuppe, Durchziehen des Mastdarmendes und zirkuläres Ver-nähen der Haut ohne jede Spannung.

Glatter postoperativer Verlauf; das durch Bougieren offengehaltene Mastdarmende heilt glatt ein.

Am 22.9.36 wird der Bauchafter geschlossen.

Bei der Entlassung am 30.10.36 besteht ein breiter, durch keine Narben beeinträchtigter Damm, der Defekt in der hinteren Vaginalwand ist verschlossen. Das Kind entleert 2 bis 3 mal täglich geformten Stuhl ohne Schwierigkeit.

Nachuntersuchung nach zwei Monaten: Bougierung bis Hegar 10 möglich, mit dem eingeführten Kleinfinger sind Kontraktionen des Sphinkters wahrzunehmen.

Nachuntersuchung nach 2 1/2 Jahren (April 1939): Sehr guter Allgemeinzustand, tägliche willkürliche Stuhlentleerungen durch den natürlichen After. Eine Vaginalkommunikation ist nicht wieder aufgetreten. Ein kräftiger Sphinkterverschluß ist fühlbar, es besteht eine völlig normale Analfunktion.

Bei dem zweiten Fall von A. a. vag., der nach der ischiorektalen Methode operiert wurde, handelt es sich um ein neunjähriges Mädchen B. J.

Mißbildungen irgendwelcher Art sind in der Familie nicht bekannt. Der Stuhlgang erfolgt von Geburt an durch die Scheide und geht unwillkürlich ab, ein 5—6 maliger Wäschewechsel ist täglich nötig, um das Kind einigermaßen rein zu halten.

Es handelt sich um ein kleines, geistig regsames Kind in einem eben befriedigenden Ernährungs- und Kräftezustand. Die Analfurche ist nur angedeutet, ein Sphinkter nicht festzustellen. Mit einer Sonde mittleren Grades kommt man leicht durch die Scheide ins Rektum, dabei wird der Stuhlabgang per vaginam deutlich.

Am 2.7.37 wurde die ischiorektale Operation von Dr. Klages ausgeführt.

Schnitt parallel zur Analfurche rechts, zirkuläre Umschneidung der Analöffnung in der Scheide. Lösung der Kommunikationsstelle des Rektums von der Scheide. Stumpfes Freimachen des Rektums, das sich gut herabziehen läßt. An der Stelle des normalen Afterdurchtrennung der Haut und des Unterhautgewebes. Ob ein Schließmuskel vorhanden ist, läßt sich nicht entscheiden. Durchziehung des unteren Rektumrandes durch einen Hautschnitt in der Analfurche und Vernähung der Schleimhaut mit der Haut. Einlegung eines Drains ins Rektum. Verschließen des Ischiorektalschnittes.

Glatter Wundverlauf. Tägliche Bougierung des Afteres bis Hegar 12.

Am 14.8.37 wird das Kind als geheilt entlassen.

Am 8.4.38 erfolgt die Wiederaufnahme in der Klinik. Der Stuhl entleert sich zum größten Teil aus der operativ angelegten Afteröffnung; der geringere Teil des Stuhles tritt durch eine Mastdarmscheidenfistel, die für eine Sonde eben passierbar ist.

Am 19.4.38 wird von einem zwischen Scheide und Mastdarm verlaufenden Schnitt aus unter sorgfältiger Blutstillung zwischen Scheide und Mastdarm bis zur Kommunikation beider Organe eingegangen. Die Fistel wird ausgeschnitten, das Loch in der Scheide genäht. In die Lücke zwischen Mastdarm und Scheide wird ein größerer seitlicher Fettlappen eingeschlagen und fixiert. Naht am Stammes.

Glatte Wundverlauf. Bougieren des Afters bis Hegar 16 möglich. Die Kotentleerung erfolgt zwei Wochen nach der Operation nur noch aus dem After.

Eine am 31.5.38 vorgenommene Röntgenaufnahme des Darmes mit Kontrasteinlauf zeigt deutlich ein Megasisigma.

Patient wird bei gutem Allgemeinzustand entlassen.

In den folgenden 8 Wochen befindet sich das Kind in Erziehung bei einer Pflegemutter, der es gelingt, eine fast völlige Continentia zu erhalten. Es wird streng darauf geachtet, daß bei jedem Stuhlbrand sofort der Abort aufgesucht wird. Ein Stuhlgang per Vaginum findet nicht mehr statt.

Vom August bis Oktober 1938 befindet sich das Kind bei der eigenen Mutter, wo es infolge völliger Verständnislosigkeit und Gleichgültigkeit der Mutter wieder inkontinent wird. Dann kommt das Mädchen in einem völlig verwahrlosten Zustand, mit Läusen und Wunden behaftet, zu seiner Pflegemutter zurück, deren erzieherischem Einfluß es gelingt, nach einigen Wochen eine praktisch vollständige Kontinenz wieder zu erzielen. Das Kind besucht die Schule, die Lehrerinnen kann einen unfreiwilligen Stuhlabgang nicht mehr wahrnehmen. Durch die Scheide ist auch weiterhin ein Stuhlgang nicht mehr erfolgt. Das Kind ist sehr gut gediehen, hat stets einen vorzüglichen Appetit. Ein aufgetriebener Leib wird niemals mehr festgestellt. Gelegentlich tritt eine Verstopfung nach Genuß von Schokolade ein, sonst ist der Stuhlgang völlig normal. Die Beobachtung des Kindes reicht bis zum Februar 1939, also länger als 1½ Jahr nach der Durchführung der ischiorektalen Operation.

Bei dem dritten Fall von A. a. vag., der nach der ischiorektalen Methode operiert wurde, handelt es sich um ein fünf Jahre altes Mädchen W. J.

Die Eltern und die 7 Monate alte Schwester sind gesund, die Eltern untereinander nicht verwandt. Von Geburt an bestand ein unwillkürlicher Stuhlabgang durch die Scheide. Die Operation im Säuglingsalter durchzuführen wurde von drei konsultierten Ärzten abgelehnt.

Nach dem Abstillen des etwa halbjährigen Kindes bemerkte die Mutter eine zunehmende Aufblähung des Leibes. In den letzten zwei Jahren (1936—1938) wurde diese Leibaufftreibung sehr stark.

Bei der Aufnahme in die Klinik zeigt das Mädchen einen etwas reduzierten Ernährungs- und Kräftezustand. Die Haut und sichtbaren Schleimhäute sind anämisch.

Die großen Schamlippen sind nur angedeutet, das Aftergrübchen ist angelegt, der Anus völlig verschlossen. Der Kot wird durch eine erbsengroße Öffnung aus der Scheide entleert.

Am 1.3.38 wird die ischiorektale Operation von Dr. Klages ausgeführt, und zwar in der gleichen typischen Weise wie bereits im Fall 2 beschrieben. Ein Sphinkter kann bei der Operation nicht festgestellt werden.

Da der Stuhlgang durch den neuangelegten After keinen genügenden Abgang findet und die Blähung des Leibes nicht in genügender Weise zurückgeht, wird vier Tage später ein linksseitiger Anus praeternaturalis angelegt. Mit instrumenteller Hilfe werden massenhaft eingedickte Kotmassen entleert.

In den nächsten Tagen wird nach nochmaliger Entleerung des Darmes vom Anus praeter aus ein Drain eingeführt, das in der operativ angelegten Analöffnung ausmündet. An dem Drain wird ein Seidenfaden befestigt und eine laufende Sondierung ohne Ende zur Erweiterung der operativ angelegten Analöffnung vorgenommen.

Allmählich gelingt das Bougieren bis Hegar 16, dabei ergibt sich eine gewisse Passageschwierigkeit im oberen Anteil des Rektum.

Eine am 29.4.38 vorgenommene Röntgenaufnahme ergibt ein Megasigma von erheblicher Weite.

Da der Stuhlgang jetzt in genügender Weise durch den natürlichen After erfolgt, wird trotz des bestehenden Megasis am 30.4.38 der Anus praeter geschlossen.

Das Bougieren gelingt weiterhin bis Hegar 16, der Stuhlgang erfolgt durch den natürlichen After; das Allgemeinbefinden hat sich außerordentlich gebessert. Das Kind wird daher am 7.6.38 entlassen.

Bereits am 22.8.38 erfolgt die Wiederaufnahme wegen ungenügender Stuhlentleerung und starker Leibblähung.

Der Ernährungszustand ist wieder reduziert, die Hautfarbe blaß.

Der Leib ist stark aufgetrieben; links unten fühlt man im Leib eine große derbe Resistenz, die nach rechts fast zur Medianebene reicht und als stark geweiteter und gefüllter Dickdarm angesprochen wird. Der Anus praeter zeigt eine reizlose Vernarbung, die Analöffnung ist für eine Fingerkuppe eingängig.

Es wird sofort eine Anus praeter an der alten Stelle angelegt, reichlich Kotmassen werden ausgelöffelt. Es wird wieder eine Bougierung ohne Ende vom Anus praeter zum Anus naturalis durchgeführt. In den nächsten Tagen entleert sich reichlich Kot aus dem Anus praeter, nur wenig aus dem Anus naturalis.

Im Oktober 1938 wird der Versuch gemacht, durch Heftpflasterverschluß des Anus praeter die Stuhlentleerung zunächst vermittels Gummischlauch aus dem Anus naturalis vor sich gehen zu lassen,

doch ohne jeden Erfolg. Der Anus praeter muß weiterhin offen lassen werden.

In diesem Zustand fühlt sich das Kind verhältnismäßig wohl, hat guten Appetit und bessert sich in seinem Allgemeinzustand außerordentlich.

Am 12.11.38 erfolgt die Entlassung mit Anweisung zu täglicher Spülung des Anus praeter.

Bei der am 3.5.39 erfolgten Nachuntersuchung gibt die Mutter der Patientin an, daß der Stuhlgang jeweils nach der Spülung täglich aus dem Anus praeter erfolge, dagegen keinerlei Stuhlgang aus dem Anus naturalis. Eine Auftreibung des Leibes wurde niemals mehr beobachtet. Mit der körperlichen Entwicklung des Kindes ist die Mutter außerordentlich zufrieden. Das Kind besucht die Schule, muß täglich dazu 1 1/2 Stunden Weg zurücklegen, was ohne jede Anstrengung geschieht.

Die Untersuchung ergibt, daß der Allgemeinzustand ausgezeichnet ist. Der Leib ist weich, überall gut eindrückbar, nicht im geringsten aufgetrieben, nirgends zeigen sich Resistenz.

Der Anus praeter funktioniert gut, der Anus naturalis ist verschlossen.

Eine Röntgenaufnahme des Sigma mit Kontrasteinlauf durch den Anus praeter zeigt ganz genau das gleiche Bild wie vor der ersten Anlegung des Bauchfters: ein Megastigma ganz erheblichen Ausmaßes.

Das Dauerresultat der nach der ischiorektalen Methode von Klages operierten Fälle von A.a.vag. ist in den beiden ersten ausführlich wiedergegebenen Fällen zweifelsohne sehr gut, im letzten Falle machte die starke Neigung des Anus und des Rektum zur Schrumpfung bei gleichzeitig vorhandenem Megastigma einen anfänglichen Erfolg wieder zunichte. Immerhin ist der gut funktionierende Anus praeter für das Kind eine wahre Wohltat gegenüber dem Zustand der Inkontinenz vor der Operation und dem Zustand eines chronischen Ileus.

Es ist nicht anzunehmen, daß in den aufgeführten drei Fällen von A.a.vag. eine der bisher bekannten Operationsmethoden ein besseres Dauerresultat hätte ergeben können.

Der ohne jede Komplikation zur völligen Ausheilung gekommene Fall 1 gibt den klarsten Beweis für die Güte der Operationsmethode. Die Vorteile der ischiorektalen Operationsmethode sind auch sehr einleuchtend. Wenn Borchard zur Hauptforderung für die Operationsmethoden der Analatresien erhebt, daß die Übersicht eine genügende sein und vor allen Dingen der Sphinkter externus geschont werden muß, so erfüllt die ischiorektale Operationsmethode diese Forderung in der idealsten Weise. Die Übersicht über das Operationsgebiet ist vom ischiorektalen Schnitt aus in jeder Phase der Operation denkbar günstig und der Sphinkter externus wird überhaupt nicht angerührt. Wenn die Voelckersche Operationsmethode sich bei

der Prostatektomie nicht so eingebürgert hat, so liegt das an den Schwierigkeiten, die bei dem Versuch der Trennung des Mastdarms von der Prostata aufzutreten pflegen, worauf Voelcker übrigens selbst hingewiesen hat. Diese Schwierigkeiten bestehen naturgemäß nicht bei der Operation der A. a. vag. Eine von der Scheide her eingelegte Sonde kann im übrigen die Recto-Vaginalkommunikation im Operationsfelde deutlich machen.

Daß der Fall 2 ein nicht ganz so gutes Operationsresultat ergeben hat wie der Fall 1, liegt einmal an der mangelhaften Ausbildung der Sphinkter externus — im Fall 1 konnte dieser deutlich gefühlt werden, im Fall 2 dagegen nicht —, außerdem aber noch an der Neigung zur Wiedervereinigung des Rektum mit der Vagina, die eine zweite Operation zur endgültigen Beseitigung der Kommunikation erforderlich machte. Auffallend blieb schließlich noch das Bestehen eines Megasismas. Das gute Operationsresultat konnte in diesem Falle durch eine verständnisvolle Erziehung gesichert, wie durch eine vorübergehende schlechte erzieherische Beeinflussung fast wieder in Frage gestellt werden. Die Kontinenz läßt sich, wie Starlinger angegeben hat, auch bei mangelhafter Funktion des Sphinkter externus durch den Sphinkter internus und die Levatoren in erheblichem Maße ausgleichen. Diese Umstände müssen wir für den Fall 2 annehmen, wo trotz Fehlens des Sphinkter externus eine gute Continentia alvi erzielt wurde.

Im Fall 3 war gleichfalls ein Sphinkter externus nicht nachzuweisen, ferner bestand eine gewisse Passageschwierigkeit im höheren Rektumanteil und ein Megastigma erheblichen Ausmaßes; schließlich hatte sich als Folge der Rektumstenose und des Megastigma ein Zustand von chronischem Ileus mit deutlicher Rückwirkung auf den Allgemeinzustand ausgebildet.

Der mehrfache Versuch, den frühzeitig angelegten Anus praeter wieder für dauernd zu schließen, mißlang infolge der Megastigmabildung. Wir müssen in dieser Mißbildung bei unserem Fall eine angeborene Störung im Sinne Hirschsprungs annehmen und können diesen Zustand nicht einfach als erworben infolge der tatsächlich vorhandenen Rektumstenose betrachten.

Göppert und Zarfl haben angegeben, daß es mit einem genügend langen Darmrohr meist gelingt, über die Abknickungsstelle des Sigma, die bei der Megastigmabildung immer zu finden sei, hinwegzukommen und vermittels Dauerdrainage vorzügliche Erfolge zu erzielen.

Bei unserem Fall 3 konnten weder mit der systematischen drei Monate lang durchgeführten Bougierung des gesamten verengten Darmbezirks noch mit einem über ein Jahr störungslos funktionierenden Anus praeter irgendwelche Erfolge hinsichtlich der Beseitigung der außerordentlichen Sigmaausdehnung erzielt werden. Die Röntgenaufnahme zeigt das Megastigma am 3.5.39 in genau der gleichen Ausdehnung wie am 29.4.38. Ein rein mechanisch bedingtes Megastigma

1
fleht aber nach einjähriger Beseitigung des Hindernisses in seiner Ausdehnung zurückzugehen.

Es wurde bereits erwähnt, daß nach C. H. Schröders Ansicht Wachstumshemmungen infolge vorzeitiger Erschöpfung der Entwicklungsfähigkeiten und vermehrtes Wachstum parallel zu laufen scheinen. So ist es durchaus möglich, daß das von uns auch in anderen Fällen von Analatresie beobachtete gleichzeitige Vorkommen von Megasigma keine Zufallserscheinung ist und auch nicht das Megasigma nur eine Folge der Analatresie ist, sondern daß diese beiden Mißbildungen gewissermaßen der negativ und der positiv gerichtete Teil eines verkehrt gesteuerten Entwicklungsvorganges sind.

Aus derartigen Erwägungen heraus wurde in einem vierten hier beobachteten Fall von A. a. vag. mit monströs erweiterter Sigmaschlinge von vornherein auf jede plastische Operation verzichtet und zur Totalresektion des Sigmas und des Rektums geschritten (4.4.39). In diesem Falle handelt es sich um ein 14jähriges Mädchen J. G., bei dem mit 1½ Jahren und später nochmals in auswärtigen Krankenhäusern auf perinealem Wege völlig vergeblich versucht worden war, normale Verhältnisse herzustellen. In unserer Klinik wurde durch tagelang fortgesetzte Spülungen, die durch die Vaginalkommunikation hindurch vorgenommen wurden, Unmengen von Kot entleert. Trotzdem ergab die danach ausgeführte Röntgenaufnahme eine Sigmaschlinge von gewaltigen Ausmaßen.

Das Sigma und Rektum wurde in typischer Weise nach dem Hocheneggschen Durchziehverfahren entfernt.

Zum Beweise der Häufigkeit des kombinierten Auftretens von Fehlbindungen am Enddarm mit angeborener Überentwicklung an anderen Darmteilen mag auch noch der Fall einer Atresia ani simplex dienen, bei dem eine beträchtliche Erweiterung der obersten Dünndarmabschnitte zu beobachten war. Es handelte sich um einen zwei Tage alten Knaben D. B., der 1937 in der hiesigen Klinik aufgenommen wurde.

Die von Berkenheier empfohlene Frühoperation der Säuglinge mit A. a. vag. mittels plastischer Methoden muß abgelehnt werden. Die bereits erwähnten schlechten Erfolge — 3 Todesfälle bei 3 Rizzolischen Operationen — sind sicherlich darauf zurückzuführen, daß ein Säugling einen so schweren Eingriff nicht vertragen kann, wenn nicht zu besonderen Vorsichtsmaßnahmen gegriffen wird.

Klages hat daher auch bei dem von ihm zuerst operierten 5 Monate alten Kinde zunächst einen Anus praeter angelegt, ehe er seine Operationsmethode anwandte. In der Anlegung eines Anus praeter sehen wir keineswegs das letzte Zufluchtsmittel wie Spitzzy und v. Reuß. Bei den meist hochsitzenden Endigungen des Rektum in den Fällen von A. a. vag. wird eine plastische Operation immer ein schwerer Eingriff sein, zumal sich der Patient häufig in keinem guten Allgemeinzustand befindet. Deshalb sollte man es sich reiflich überlegen, ob es zweckmäßig ist, sofort den Versuch zu machen, durch

einen größeren operativen Eingriff normale Verhältnisse herzustellen Ebrard, Desmaret, Bell u. a. empfehlen ja auch prinzipiell die primäre Anlegung eines Anus praeter. Die so häufigen Ileuserscheinungen können mit absoluter Sicherheit überhaupt nur durch Anlegung eines Anus praeter beseitigt werden. Für den akuten Ileus empfiehlt auch Kleinschmidt den Anus praeter. Das Resultat bei einem für die Dauer angelegten Bauchafter kann außerdem sehr gut sein, wie unser Fall 3 lehrt.

Die Erfolge der operativen Behandlung der A. a. vag. in ihren verschiedenen Methoden zahlenmäßig zu erfassen, ist leider nicht möglich. Sammelstatistiken existieren nicht über die A. a. vag., sondern nur über sämtliche Analatresien. So haben Curling, Cripps und Anders je 100 Fälle von Analatresien veröffentlicht, von denen übrigens etwa die Hälfte ad exitum kam.

Anders erwähnt vier Fälle von A. a. vag., von denen einer verstarb. Berkenheier hat 5 Fälle von A. a. vag. veröffentlicht, von denen einer nicht operiert wurde, von den vier operierten Fällen kamen drei ad exitum.

Starlinger berichtet über 5 operierte Fälle von A. a. vag., von denen 3 tödlich ausgingen; ein plastisch operiertes Kind blieb ungeheilt und nur ein Kind war nach zweimaliger Proktoplastik jahrelang kontinent und völlig beschwerdefrei.

Die meisten Einzelveröffentlichungen über A. a. vag. sind für Zusammenstellung von Sammelstatistiken deshalb nicht zu verwerten, weil der Unterschied zwischen der reinen A. a. vag. und der Atresia ani vestibularis allzuhäufig entweder gar nicht oder ungenügend durchgeführt ist.

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Literatur und der Erfahrungen der Chirurgischen Universitätsklinik zu Halle (S.) muß der Schluß gezogen werden, daß die Spätergebnisse der ischiorektalen Operation bei der A. a. vag. von folgenden Faktoren abhängig sind:

1. vom Alter und dem Allgemeinzustand des Patienten,
2. von der Höhe, in der der Blindsack des Rektum endet,
3. von den übrigen angeborenen Veränderungen des Darms (Megacolon),
4. von dem Vorhandensein eines Sphinkter ani externus,
5. von angeborenen Mißbildungen anderer Organe,
6. von der klinischen und häuslichen Nachbehandlung.

Zu 1: Säuglinge sind für die primäre ischiorektale Operationsmethode grundsätzlich nicht geeignet. Sie vertragen keine schweren Eingriffe, zu denen außer der ischiorektalen Operationsmethode selbstverständlich auch alle anderen proktoplastischen Operationsmethoden zu rechnen sind. Beim Säugling kommt als primäre Operation nur die Proktotomie und die Colotomie in Frage; erstere nur dann, wenn der Sphinkter und der sich vorwölbende Enddarm deutlich zu fühlen sind, also nur in den ganz leichten Fällen. Sonst sollte primär nur

1
n Anus praeter naturalis iliacus sinister angelegt werden. Eine plastische Operation kann bei älteren Säuglingen, die sich in einem sehr guten Allgemeinzustand befinden müssen, einige Zeit darauf aus-
geführt werden. Die ischiorektale Operationsmethode hat sich dabei bewährt.

Zu 2: Je höher das Rektum endet, desto schwieriger ist die Operation, desto hartnäckiger auch das Wiederauftreten der Vaginalkommunikation. Gerade in den Grenzfällen, in denen es von vornherein vielleicht zweifelhaft erscheinen mag, ob der Weg von unten überhaupt noch zum Ziele führt, ist die Methode von Klages wegen der guten Übersichtlichkeit den perinealen Methoden von Dieffenbach und Rizzoli bestimmt überlegen. Läßt sich der Blindack von dem Ischiorektalschnitt aus nicht genügend mobilisieren, so muß das Peritoneum eröffnet werden, was in unseren drei Fällen nur einmal nötig war und sich ohne besondere Schwierigkeiten durchführen ließ. Unter allen Umständen muß erreicht werden, daß der Darm ohne Spannung in die Haut des Afters eingenäht werden kann, da sonst die Fäden durchschneiden und sowohl Infektion wie erneute Atresie des Darmes als Folge droht.

Zu 3: Die größten Schwierigkeiten haben uns diejenigen angeborenen Mißbildungen des Darmes gemacht, die zwar nicht zum eigentlichen Krankheitsbilde der A. a. vag. gehören, aber doch sehr häufig mit ihr gleichzeitig auftreten. Es sind das die Atresien an höheren Stellen des Darmes und vor allem die Megasigmabildung. Sie können jede plastische Operationsmethode zum Scheitern bringen. Eine vor der Operation durchgeführte Röntgenaufnahme, wenn möglich mit Kontrasteinlauf durch die Vaginalkommunikation hindurch, kann unter Umständen vor zwecklosen plastischen Operationen warnen.

Zu 4: Je besser der Sphinkter ani externus ausgebildet ist, desto besser sind die Aussichten für die Herstellung einer Continentia alvi. Daher muß bei der Operation der Sphinkterbereich unter allen Umständen geschont werden, auch dann, wenn ein Schließmuskel funktionell nicht nachweisbar ist, denn er kann immerhin angelegt und auch entwicklungsfähig sein, wenn auch nur eine Analgrube angedeutet ist, wie uns die Untersuchungen von Anders gelehrt haben. Eine absolut sichere Schonung des Schließmuskels ermöglicht die Klagesche Operation.

Zu 5: Angeborene Mißbildungen anderer Organe kommen an sich bei der A. a. vag. verhältnismäßig häufig vor. Sie können schon für sich eine absolut schlechte Prognose abgeben, wie z. B. doppel-
seitige Ureteren- oder Nierenmißbildungen. In unseren Fällen konnten wir eine derartige Beobachtung nicht machen.

Zu 6: Daß die Spätresultate jeder Operationsmethode von einer verständnisvollen Nachbehandlung wesentlich abhängen, ist ohne weiteres einleuchtend.

Meist ist ein regelmäßiges längeres Bougieren der neugeschaffenen Afteröffnung notwendig. Ohne diese Art der Nachbehandlung wären auch unsere Resultate voraussichtlich weniger günstig geworden.

Durch Anhalten des operierten Kindes zur regelmäßigen Stuhlentleerung bei dem geringsten Stuhldrang ist es — wie wir in unserem Fall 2 zeigen konnten — mitunter möglich, auch bei mangelhafter Ausbildung des äußeren Schließmuskels eine gute Kontinenz zu erhalten. Der Sphinkter internus und der Levator ani können den äußeren Schließmuskel in seiner Funktion zum Teil ersetzen.

Eine schlechte Erziehung kann, wie wir in unserem Fall 2 ebenfalls aufzeigen konnten, ein an sich gutes Operationsresultat fast völlig illusorisch machen.

Die drei beschriebenen Fälle von A. a. vag., die in den letzten drei Jahren an der Chirurgischen Klinik zu Halle nach der ischiorektalen Methode von Klages operiert wurden, geben quoad vitam eine absolut gute Prognose, aber auch in sozialer Hinsicht müssen alle drei Fälle prognostisch günstig beurteilt werden; in der körperlichen Entwicklung sind alle drei Kinder sehr gut voran gekommen. Auch das Kind mit dem Anus praeter kann ohne jegliche Behinderung die weit entfernt liegende Schule besuchen. Alle drei Mädchen werden auch in Zukunft im Kampf ums Dasein kaum behindert sein. Wenn auch die Erblichkeit der A. a. vag. in keinem der drei Fälle nachzuweisen war, so ist sie nach den erwähnten Veröffentlichungen von Bollmeyer, Bokai, Hadra, König und Wutzer doch anzunehmen.

Eine gewisse Tragik könnte man vielleicht darin erblicken, daß je besser die Operationsmethode und ihre Durchführung ist, je besser also dem Einzelindividuum geholfen wird, um so mehr die Erbmassen des Volkes dadurch gefährdet wird, daß die operierten Mädchen unter Umständen später heiratsfähig werden. Die Frage nämlich, ob die Mädchen mit A. a. vag. auch dann unter das Sterilisierungsgesetz fallen, wenn die Erblichkeit sich im Einzelfalle nicht nachweisen läßt, ist noch gänzlich offen.

Gütt-Rüdin-Ruttke empfehlen die Träger schwerer Mißbildungen einer Sterilisierung zuzuführen, wenn „die Erblichkeit durch die Zwillings- und Familienforschung im allgemeinen als generell erwiesen erachtet werden kann“ oder wenn die Mißbildung „nach ihrer besonderen klinischen Ausprägung erfahrungsgemäß als erblich anzusehen ist, auch wenn zufällig in deren eigener Familiengeschichte ein ähnlicher Fall nicht nachgewiesen werden kann.“ Bei der A. a. vag. kann von einem „zufälligen“ Fehlen des „ähnlichen Falles in der Familiengeschichte“ niemals die Rede sein, da das gleichzeitige Vor-

ammen einer ähnlichen Mißbildung in der Familie bisher nur in der
nderzahl der Fälle nachzuweisen war. Wichtig aber erscheint, daß
em Menschen, der sonst anderen Volksgenossen sein Leben lang
Berordentlich schwer zur Last fallen würde, durch eine Operation
zu verholfen werden kann, ein nützliches Glied unserer Volks-
meinschaft zu werden. Hierin liegt vor allem der soziale Wert
r ischiorektalen Operationsmethode.

Zusammenfassung.

Nach Darlegung der verschiedenen Anschauungen über die Genese
r Atresia ani vaginalis werden die bisher üblichen Operations-
verfahren kritisch dargestellt.

Es wird über drei Fälle von Atresia ani vaginalis der Chirurgi-
hen Universitätsklinik Halle berichtet, bei denen die ischiorektale
perationsmethode angewandt wurde. Diese Operationstechnik stellt
ne Verbesserung der bisher üblichen dar, da sie Übersichtlichkeit und
ewebsschonung bestmöglich vereint.

Die Spätergebnisse sind weitgehend abhängig vom Zusammen-
effen dieses Krankheitsbildes mit anderen Mißbildungen, vor allem
em Megasigma congenitum.

Zwei Fälle konnten geheilt und ein Fall einer wesentlichen
esserung zugeführt werden.

Am Schluß der Arbeit sei es mir gestattet, Herrn Dr. med. habil.
lages meinen ergebensten Dank für die Anregung zu dem Thema und
ie Übernahme des Referates auszusprechen.

LITERATUR-VERZEICHNIS.

- Anders, H. E.: Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Bd. 160.
Berkenheier: Beiträge zur Kenntnis von Atresia ani vaginalis und vestibularis. Inaug.-Diss. München 1906.
Desmaret u. Ebrard: Zentralorgan für die ges. Chirurgie und Grenzgebiete. 1927. Bd. 37.
Dienst: Virchows Archiv 154.
Kutter: Beiträge zur klin. Chirurgie. Bd. 138.
Potts: Zentralorgan f. d. ges. Chirurgie u. Grenzgebiete. 1933. Bd. 60.
Schröder, C. H.: Beiträge zur klin. Chirurgie. Bd. 163.
Starlinger u. Richter: Zentralblatt für Chirurgie. 1933. S. 2893.
Stieda: Archiv für klin. Chirurgie. Bd. 70.
Aschoff: Spez. path. Anatomie.
Bonnet: Entwicklungsgeschichte.
Borchard: Garré-Küttner-Lexer, Handbuch d. Chirurgie.
Drachter: Chirurgie des Kindesalters.
v. Esmarch: Die Krankheiten des Mastdarmes und des Afters.
Fischer, A. W.: Bier-Braun-Kümmel, Operationslehre.
Halban-Seitz: Biologie und Pathologie des Weibes. VIII, 2.
Kirmisson: Lehrbuch der chirurgischen Krankheiten angeborenen Ursprungs.
Kleinschmidt: Chirurgische Operationslehre.
Reichle: Kirschner-Nordmann, Chirurgie, Bd. V.
v. Reuß: Die Krankheiten des Neugeborenen.

LEBENS LAUF.

Ich, Ernst Adalbert Schroeder, wurde geboren am 3.5.1895 in Glogau i. Schlesien, bin deutscher Staatsangehörigkeit, besuchte das evangelische Gymnasium zu Glogau bis zu der Ostern 1913 bestandenen Reifeprüfung. Ich studierte in Jena und Heidelberg Medizin, trat am 1.4.1914 als Einj.-Freiw. in das Grenadierregiment 110 ein, machte dann den Weltkrieg von Anfang bis zum Ende an der Front mit, erhielt das E.K. I. und II. und wurde zweimal verwundet. Nach Beendigung des Krieges trat ich sofort beim freiwill. Landesjägerkorps des General Maercker ein und war an der Befreiung Halles von den Kommunisten aktiv beteiligt. Mein medizinisches Studium nahm ich im Herbst 1919 in Halle wieder auf, bestand dort Ostern 1920 die Vorprüfung und ebenfalls in Halle Ostern 1922 das Staatsexamen; mit dem 15.12.1922 erhielt ich meine Bestallung als Arzt. Nach Ableistung des praktischen Jahres am Krankenhaus Bergmannstrost und in der medizinischen Poliklinik in Halle war ich nach vielfachen ärztlichen Vertretungen und assistenzärztlicher Tätigkeit zuletzt am Lindenburger-Krankenhaus in Berlin. Im Jahre 1931 war ich als Vertragsarzt der versorgungsärztlichen Untersuchungsstelle in Kassel beschäftigt. Seit 1932 bin ich in Reichenbach i. V. als praktischer Arzt niedergelassen.

Schwerste wirtschaftliche Sorgen zwangen mich als Studenten, meinen Lebensunterhalt durch Arbeit im Kohlenbergwerk (Grube Elisabeth in Mücheln) zu verdienen. Späterhin trat zu den eigenen Schwierigkeiten die Notwendigkeit, fortgesetzt für meine Angehörigen zu sorgen, so daß ich an eine Promotion aus finanziellen Gründen früher nicht denken konnte.

